







# ¿EXISTEN FACTORES PREDICTIVOS NEGATIVOS PARA LOS RESULTADOS DE LAS INFILTRACIONES FACETARIAS LUMBARES?



Carmen Valverde Gestoso, Conrado Saiz Modol, Rafael Llombart Blanco, Matías Alfonso Olmos-García, Julio Domenech Fernández  
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

- EEUU 2ª causa de atención médica: **LUMBALGIA** → 38- 50 billones de \$/año
- España: más de 55000 diagnósticos de lumbalgia/años → **22 días de baja laboral**
- Prevalencia lumbalgia países industrializados: **60-80%**
- **Factores psicosociales:** gran relevancia



	INFILTRACIÓN +	INFILTRACIÓN -
END COLUMNA	8	5
END PIERNA	4	6
OSWESTRY	28%	42,2%
SF 12 PCS 12	24,91%	25,86%
SF12 MCS 12	51,39%	38,96%
CATASTROFIZACIÓN	24	23,5
FABQ	34	50

Los pacientes a los que se les acaba **indicando una infiltración facetaria:**

- Media de edad y un IMC más alto
- Más sedentarios y menos empleados

Los pacientes en los que la **infiltración fue negativa:**

- Mayores limitaciones cotidianas por el dolor lumbar
- Realizan más acciones evitativas por creencia de aparición del dolor