

TRIAJE: ¿DE QUIÉN SON LAS MORDEDURAS DE PEZ? FASCITIS POR UNA CAUSA POCO HABITUAL.

Perera Fernández de Pedro, S.; García Cantarero, M.; De la Esperanza Rico, J.; Guijarro Valtueña, A.; Torrijos Garrido, P.J.

Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda

OBJETIVOS

Las mordeduras son un motivo de consulta relativamente habitual en las Urgencias. Sin embargo, los responsables de dichas lesiones no son siempre los animales a los que estamos más acostumbrados. El objetivo de nuestro trabajo consiste en presentar un caso de una mordedura por un animal muy poco habitual.



MATERIAL Y METODOLOGÍA

Mujer de 20 años que acude por mala evolución de mordedura de pez (no sabe especificar especie) dos días atrás. Presenta tumefacción dolorosa a la palpación en todo el miembro inferior derecho desde la raíz del muslo hasta los dedos de los pies, con una herida en la cara anteromedial del muslo de 0,5 cm con exudado seroso a la extrusión. En la analítica de sangre presenta 22000 leucocitos, 19000 neutrófilos y una proteína C reactiva superior a 250. Ante dichos hallazgos, se solicita un TC en el que se objetiva abundante edema en el tejido celular subcutáneo en toda la extensión del miembro y líquido en la fascia profunda del muslo y la pierna de predominio en los compartimentos anterior y medial del muslo, sin evidenciarse colecciones ni gas.

Inicialmente, se inicia tratamiento con Ciprofloxacino, Ceftriaxona y Clindamicina y con corticoides, con una notable mejoría clínica y analítica, por lo que inicialmente se descarta actitud quirúrgica.


Tras una semana de ingreso, en la que se logra una importante mejoría clínica y una normalización de los reactantes de fase aguda, se da de alta a la paciente con Ciprofloxacino 500mg cada 8 horas y Cefixima 400mg cada 12 horas durante 4 semanas y corticoterapia descendente.

RESULTADOS

La paciente es seguida de manera ambulatoria y, 6 meses después, se encuentra completamente asintomática y ha recuperado sus actividades de la vida diaria sin ningún tipo de repercusión funcional.

CONCLUSIONES

Las mordeduras son un motivo de consulta relativamente frecuente en los servicios de Urgencias, siendo habitualmente provocadas por animales domésticos, como perros o gatos, y habitualmente en el miembro superior. Sin embargo, no podemos olvidar que los responsables pueden ser otros mucho menos habituales, como los animales acuáticos. En estos casos, el conocimiento del agresor puede ser crucial a la hora de elegir la antibioterapia más adecuada.



 Hospital Universitario
Puerta de Hierro
Majadahonda

6 CONGRESO
secot

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA