

RESULTADO DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y CONSERVADOR EN LAS FRACTURAS DE CLAVÍCULA. ESTUDIO DESCRIPTIVO

Autores: Martínez I, L. Orosa C, Álvarez P, Muñoz D, Dueñas A

INTRODUCCIÓN:

Las fracturas de clavícula clásicamente han recibido tratamiento conservador, siendo pocas las indicaciones de tratamiento quirúrgico. En la actualidad hay más artículos que defienden que el tratamiento quirúrgico, ya que da mejores resultados en términos de: correcta consolidación y tiempos de recuperación.


MATERIAL Y MÉTODOS:

Se realizó una recogida de datos de las fracturas de clavículas atendidas en el Hospital U. de Fuenlabrada entre los años 2008-2022


RESULTADOS:

- Fractura de clavículas, n= 65. Edad media de 40 años.

TIPO DE TRATAMIENTO



RESULTADOS DE CONSOLIDACIÓN




Ejemplos de casos con fracturas con 3º fragmento, acortamiento y gran desplazamiento, tratados de diferente manera:

CONSERVADOR




TTO QX AGUDO



TTO QX NO AGUDO



TIEMPO DE SEGUIMIENTO



En general hubo pocas complicaciones con el tratamiento quirúrgico, con una tasa de EMO de 12%

CONCLUSIÓN:

El tratamiento quirúrgico cada vez tiene más indicaciones en las fracturas de tercio medio de clavícula, ya que se ha visto que tiene mejores tasas de consolidación correcta, de resultados funcionales, menores tiempos de seguimiento, con pocas complicaciones y baja tasa de EMO.