

EMPLEO DE LA TRIPLE ARTRODESIS EN UNA PACIENTE CON SECUELAS DE PIE ZAMBO

Pastor Mallagray S, García Fernández C, Blázquez Bonilla M, Diaz Cano G, Velasco García M
Complejo Hospitalario Universitario Badajoz

INTRODUCCIÓN

Las deformidades del pie en población pediátrica son una patología frecuente cuyo tratamiento se debe elegir en función del tipo de deformidad, la severidad de la misma y las características del paciente. El propósito de este poster es, a propósito de un caso, exponer la técnica de la triple artrodesis, su utilidad, sus indicaciones y sus complicaciones en el tratamiento de las deformidades del pie en la edad pediátrica.



MATERIAL Y MÉTODOS

Se presenta el Caso de una paciente de 16 años con pie equinocavo varo severo que se interviene de triple artrodesis remodelante + osteotomía extensora primer meta pie izquierdo. Se realiza incisión tipo Olier hasta exposición de articulaciones calcáneo cuboidea y astrágalo escafoidea. Con escoplo se realizó osteotomía substractora para corregir el pie equino cavo varo, fijándola con grapas de Blount y agujas de Kirschner. A continuación, se practicó osteotomía extensora de primer MTT fijada con grapa.



RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La triple artrodesis (TA) del pie consiste en la fusión de la articulación astragaloescafoidea, subastragalina y calcaneocuboidea. La podoscopia, la aplicación de la escala visual analógica así como las radiografías simples son importantes para evaluar con eficacia los resultados de la triple artrodesis. Durante el seguimiento, presentó infección de la herida quirúrgica por la que se realizó desbridamiento y limpieza + extracción material de OS (grapas de osteotomía) que en la actualidad se encuentra resuelta y con un adecuado índice de consolidación.

La triple artrodesis es una técnica quirúrgica útil para el remodelado de las deformidades del pie plano varo congénito o adquirido, con una adecuada corrección y con bajo porcentaje de recidiva de la deformidad.