

Hamartoma lipofibromatoso en el segundo espacio interdigital del pie. Entidad muy infrecuente.

*Rodríguez Márquez, A.; Santana,S; Montilla, Z.
Hospital Universitario Jerez de la Frontera, Cadiz*

OBJETIVOS

El Hamartoma fibrolipomatoso es un tumor benigno muy raro (menos de 90 casos descritos en la literatura), de crecimiento lento y caracterizado por la proliferación de adipocitos maduros en epineuro y perineuro de los nervios periféricos. La localización más habitual es la extremidad superior, especialmente en el nervio mediano (80%).

Su manejo suele ser conservador, dado que se trata de tumores indolentes frecuentemente paucisintomáticos. La exéresis quirúrgica se reserva para casos muy sintomáticos por dolor incoercible o síntomas de compresión nerviosa

MATERIAL Y MÉTODO

Presentamos el caso de un varón de 49 años con dolor en el pie derecho de aproximadamente 2 años de evolución. Ha sido valorado por reumatología quien le infiltró sin buen resultado. La exploración clínica presenta dolor en región plantar intermetatarsiano segundo espacio del pie derecho con mulder positivo. Refiere irradiación al dedo. Por lo que se solicita resonancia magnética tras los resultados normales de las radiografías.

En la resonancia se observa imagen milimétrica de calcificación en segundo espacio interdigital con cambios periinflamatorios y en la ecografía describen también la imagen con lo que podría corresponder a un neuroma de morton.

Se explican hallazgos al paciente, quien al continuar sin mejoría clínica, se le propone cirugía de exéresis. Remitiendo el material a anatomía patológica.

RESULTADOS

La descripción macroscópica es un fragmento irregular de apariencia adiposa aplanada de 1,5 cm, que se diagnostica de hamartoma fibrolipomatoso.

Tras 5 semanas de la intervención continua con dolor en zona local habiendo mejorado la sensación de pinchazo, presentando buen aspecto la herida. En la siguiente revisión al mes el paciente refiere desaparición completa de la clínica y reincorporación a su ocupación laboral.

CONCLUSIONES

Siempre es importante realizar un correcto diagnóstico y tratamiento de todas las entidades, sobre todo cuando estas le causan una gran clínica al paciente, incluso llegando a condicionar las actividades más básicas de su vida diaria.

Tras cualquier exéresis que se realice de cualquier tumoración es importante hacer un adecuado diagnóstico anatomopatológico para poder filiar hasta las entidades menos frecuentes que nos podemos encontrar.

