

# COLGAJO DE ANCÓNEO PARA EL TRATAMIENTO DE DEFECTOS ÓSEOS LATERALES DE CODO

Guardiola Herráez C, Vallés Andreu M, González García J.A, García Navarro J, Valcárcel Díaz A.  
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia)

## Objetivo

El objetivo es hacer una revisión bibliográfica para evaluar el uso de colgajos musculares como artroplastias de interposición en defectos óseos laterales del codo.

## Material y métodos

Presentamos 3 pacientes de entre 50 y 60 años con antecedente de fracturas de capitellum y tróclea Dubberley 2B intervenidas mediante RAFI y que acuden a nuestra consulta con fracaso de esta y presentando pseudoartrosis de capitellum, rigidez, dolor lateral de codo y afectación de la columna lateral. Al ser pacientes jóvenes con codos estables y presentando tróclea intacta se decide la realización de una artroplastia de resección e interposición con colgajo pediculado de ancóneo.

Para ello se realiza un abordaje lateral, EMO de todo el material previo y extracción de colgajo de ancóneo con base proximal. Se realiza el pase del colgajo por debajo del ligamento colateral para retensar el mismo y se realiza una fijación con sutura transósea o sistema extracortical en la parte posterolateral del húmero.



## Resultados

Las pacientes presentaron un postoperatorio sin incidencias con una evolución satisfactoria. Actualmente con más de 1 año de evolución presentan un MEPS de 85.

## Conclusiones

El colgajo de ancóneo es una opción válida para la reconstrucción de defectos óseos radiocapitulares proximales en pacientes jóvenes evitando así la artroplastia y las complicaciones de estas.